

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

ウチダの漢方製剤

ウチダの 黄解丸加大黄

オウゲガンカダイオウ

ウチダの黄解丸加大黄は漢方処方にしたがって、生薬粉末を配合して丸剤としたものです。

成分・分量

90丸（1日分）中	
オウバク末	0.75g
オウレン末	0.75g
オウゴン末	1.5g
サンシシ末	1.0g
ダイオウ末	1.5g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬

フリーダイヤル 0120-384638

受付時間 9:00~17:30（土、日、祝日を除く）

使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
- * 2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - * (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - * (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - * (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
* 肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

- * (2) 1ヵ月位（鼻出血、二日酔に服用する場合には5~6回）服用しても症状がよくならない場合
- * 3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下痢

効能・効果

比較的体力があり、のぼせがみで顔色赤くいららする傾向のある次の諸症

鼻出血、不眠症、ノイローゼ、胃炎、二日酔、血の道症^{注1}、めまい、どうき

^{注1}「血の道症」とは婦人にみられる一種の神経症を指します。

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用する。

年齢	1回量
大人（15歳以上）	30粒
15歳未満	服用しないこと

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬
東京都中央区日本橋本町 4-2-8