

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

ウチダの漢方製剤 ウチダの 理中丸

リチュウガン

ウチダの理中丸は漢方処方にしたがって、生薬を配合し粉末化して丸剤としたものです。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬

フリーダイヤル 0120-384638

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
 - むくみ
 - (6) 次の診断を受けた人。
 - 高血圧、心臓病、腎臓病

- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位(下痢、嘔吐に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合
3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

手足などが冷えやすく、尿量が多いものの次の諸症: 胃腸虚弱、胃アトニー、下痢、嘔吐、胃痛

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用する

年齢	1回量
15才以上	20~30丸
15才未満7才以上	13~20丸
7才未満4才以上	10~15丸
4才未満	服用しないこと

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

* (2) 幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意すること。

成分・分量

本品 9.231g (90丸 1日分) 中

ニンジン	3g	} 以上の割合で混合し 粉末化したもの	7.692g
カンゾウ	3g		
ビャクジュツ	3g		
カンキョウ	3g		

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8