

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

ウチダの漢方製剤

ウチダの 香蘇散

コウソサン

ウチダの香蘇散は漢方処方にしたがって、生薬を配合して製した散剤で、特異な芳香があります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が
起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。

* (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたこ
とがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医
師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

* (2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保
管すること。

(2) 小児の手の届かない所に保管すること。

(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品
質が変わる。)

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店また
は下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬

フリーダイヤル 0120-384638

受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

効能・効果

神経質で気分がふさぎ、みぞおちがつかえ、倦怠感、食欲不振
などがあるもので、肩こり、頭重、頭痛、めまい、耳鳴、腹痛、
悪心などを伴うもの。

胃腸の弱い人の感冒、気鬱^{注)}、蕁麻疹、神経性月経困難症。

注)「気鬱」とは気のうっけつを指します。

用法・用量

次の1回量を1日3回食前1時間または食間空腹時に水また
は温湯で服用する。

年 齢	1 回 量
大人(15才以上)	2.0g
15才未満 12才迄	1.6g
12才未満 7才迄	1.4g
7才未満 5才迄	1.0g
5才未満 2才迄	0.6g
2才未満	0.3g

用法・用量に関連する注意

(1) 添付の匙はすり切りで、大匙1杯が約1g、小匙1杯が
約0.1gです。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服
用させること。

* (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先
し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分・分量

本品9.5g中

コ ウ ブ シ 4.0g

ソ ヨ ウ 1.0g

カ ン ソ ウ 1.0g

チ ン ビ 2.5g

シ ヨ ウ キ ヨ ウ 1.0g

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なる
ことがありますが、効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8