

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

ウチダの漢方製剤

ウチダの 温中止痛湯 (分包)

オンチュウシツウトウ

10
分包

ウチダの温中止痛湯(分包)は、漢方処方にしたがいに生薬を配合し抽出して得た水製エキスを用いた散剤(細粒)の分包にしたものです。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)
次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 小児で1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2日以内に服用すること。

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬

フリーダイヤル 0120-384638

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

効能・効果

やせ型で腹部筋肉が弛緩する傾向にあり、胃痛または腹痛があつて、ときに胸やけ、げっぷ、食欲不振、はきけなどを伴う次の諸症：神経性胃炎、慢性胃炎、胃アトニー

用法・用量

次の1回量を1日3回食前または食間に服用する。

年齢	1回量
大人(15歳以上)	1包
15歳未満7歳以上	2/3包
7歳未満4歳以上	1/2包
4歳未満2歳以上	1/3包
2歳未満	1/4包

用法・用量に関連する注意

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

* (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分・分量

本品1日量〔3包(1包1g)〕中

ケイヒ	3.2g
エンゴサク	2.4g
ボレイ	2.4g
ウイキョウ	1.2g
カンゾウ	0.8g
シュクシャ	0.8g
リョウキョウ	0.4g

安中散料エキス 1.25g

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8