

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

ウチダの漢方製剤

ウチダの 天地通暢

テンチツウチョウ

15
分包

ウチダの天地通暢は、漢方処方にしたがい生薬を配合し抽出して得た水製エキスを用いた散剤（細粒）の分包にしたものです。

⚠ 使用上の注意

- ❌ **してはいけないこと**
（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
- 1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
- * 2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

- 👤 **相談すること**
- 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - * (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (5) 高齢者。
 - (6) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。
むくみ
 - (8) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

* (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
* 間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
* 肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）等があらわれる。

- * (2) 1ヵ月位（きれ痔、便秘に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合
 - 3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること
 - * 4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
- 下痢

用法・用量

次の1回量を1日3回食前または食間に服用する。

年齢	1回量
大人（15歳以上）	1包
15歳未満7歳以上	2/3包
7歳未満4歳以上	1/2包
4歳未満	服用しないこと

用法・用量に関連する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本品1日量〔3包（1包2g）〕中

トウキ	3.6g
サイコ	3.0g
オウゴン	1.8g
カンゾウ	1.2g
ショウマ	0.9g
ダイオウ	0.6g

乙字湯エキス……………2.44g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 小児で1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2日以内に服用すること。

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬

フリーダイヤル 0120-384638

受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。

効能・効果

大便秘結、便秘傾向のあるものの次の諸症：
痔核（いぼ痔）、きれ痔、便秘



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8