

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

ウチダの漢方製剤

ウチダの 解筋止痛湯 (分包)

ゲキンシツウトウ

53
分包

ウチダの解筋止痛湯(分包)は、漢方処方にしたがい生薬を配合し抽出して得た水製エキスを服用しやすい散剤(細粒)の分包にしたものです。

⚠ 使用上の注意

- ❌ してはいけないこと**
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が
起こりやすくなる)
次の人は服用しないこと
(1)生後3ヵ月未満の乳児。
(2)次の診断を受けた人。
心臓病

- 🗨 相談すること**
1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)次の症状のある人。
むくみ
(5)次の診断を受けた人。
高血圧、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師
又は薬剤師に相談すること
(1)まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
うっ血性心不全 心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
**肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

- (2)5~6回服用しても症状がよくなる場合
3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

急激におこる筋肉のけいれんを伴う疼痛

用法・用量

次の1回量を1日3回食前または食間に服用する。

年齢	1回量
大人(15歳以上)	1包
15歳未満7歳以上	2/3包
7歳未満4歳以上	1/2包
4歳未満2歳以上	1/3包
2歳未満	1/4包

用法・用量に関連する注意

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

* (2)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させること。

成分・分量

本品1日量〔3包(1包1g)〕中
〔シャクヤク……………2.0g〕
〔カンゾウ……………2.0g〕
芍薬甘草湯エキス……………1.10g

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
(2)小児の手の届かない所に保管すること。
(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
(4)小児で1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2日以内に服用すること。

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬

フリーダイヤル 0120-384638

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なる
ことがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬
東京都中央区日本橋本町 4-2-8