

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

ウチダの漢方製剤

ウチダの 婦徳安潤

フトクアンジュン

73

分包

ウチダの婦徳安潤は、漢方処方にしたがい生薬を配合し抽出して得た水製エキスを用いた散剤(細粒)の分包にしたものです。

お問い合わせ先
本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。
株式会社ウチダ和漢薬
フリーダイヤル 0120-384638
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

* (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	食欲不振、胃部不快感
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

比較的体力が乏しく、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴える次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害(貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ)、めまい、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ

用法・用量

次の1回量を1日3回食前または食間に服用する。

年齢	1回量
大人(15歳以上)	1包
15歳未満7歳以上	2/3包
7歳未満4歳以上	1/2包
4歳未満	服用しないこと

用法・用量に関連する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本品1日量〔3包(1包2.0g)〕中

トウキ	1.5g
センキュウ	1.5g
シャクヤク	2.0g
ブクリョウ	2.0g
ソウジュツ	2.0g
タクシャ	2.0g

当帰芍薬散料エキス……………2.70g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 小児で1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2日以内に服用すること。

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬
東京都中央区日本橋本町 4-2-8